

هدف: شناسایی زودرس و جلوگیری از انتشار احتمالی ویروس به سایر کارکنان

دامنه کاربرد: تمامی کارکنان مراکز پزشکیاری

مسئولیت نظارت: رئیس مرکز سلامت کار و رئیس بهداشت و درمان منطقه

مسئولیت اجرا: روسای مراکز پزشکیاری

روش کار پرستار مناطق عملیاتی:

- پزشکیار موظف به اطلاع رسانی، ارائه آموزش های مناسب درخصوص علایم بیماری کووید-۱۹ با رعایت حفظ آرامش به جمعیت شاغلین می باشد.
- علایم بیماری کووید-۱۹ که بایستی به کارکنان در خصوص بروز آن هشدار داده شود شامل: تب، سرفه، گلو درد، لرز، هرگونه احساس درد و تنگی نفس می باشد.
- برنامه های آموزش و نظارت بر اساس دستور العمل های رعایت اصول بهداشت، شستشوی دست، حفاظت فردی و عمومی در محل کار و زندگی، اصول گندزدایی، مراقبت از افراد مشکوک در منزل و محل سکونت (فایل های بارگذاری شده در سایت سازمان [/piho.ir](http://piho.ir) آشنایی با کرونا ویروس) به نحو مناسب از طریق «نصب بنر، بروشور، اتوماسیون، آموزش مجازی و حضوری ... به جمعیت شاغل ارائه شود.
- با هماهنگی رئیس مرکز عملیاتی، اقدامات لازم جهت کاهش تجمع در واحدهای رستوران و اماکن عمومی و محل های استراحت را انجام دهد.
- با مشارکت رئیس سلامت کار منطقه از طریق هماهنگی با شرکت مربوطه فضا و امکانات لازم را به منظور قرنطینه مطابق «دستورالعمل قرنطینه در محل کار» فراهم نمایند.
- با مشارکت رئیس سلامت کار منطقه لیست شاغلین پرخطر تهیه گردد.
- * گروه پرخطر شامل: بیمارانی که نیاز به دیالیز و یا شیمی درمانی - رادیوتراپی، پیوند اعضا، تحت درمان با ایمونوساپرسیو (کورتون)، نارسایی قلبی، نارسایی کلیوی، بیماری کبدی فعال و مزمن مانند سیروز و هپاتیت فعال، افراد دیابتیک دارای عوارض ارگان های انتهایی
- روزانه غربالگری علایم شبه آنفلوانزا جهت تمامی شاغلین (صبحکار و یا نوبتکار) رسمی و غیررسمی و مراجعین را با مشارکت حراست منطقه عملیاتی انجام پذیرد.

عملکرد مراکز پزشکیاری در شناسایی و مراقبت از افراد مشکوک مبتلا به کووید-۱۹

- روزانه بصورت تلفنی / ارسال فکس فوری ، وجود و یا عدم وجود شاغلین مشکوک و دارای علائم شبه آنفلوانزا را به رئیس سلامت کار منطقه / رئیس مراکز پزشکیاری گزارش و در خصوص اقدامات لازم مشاوره دریافت نماید .
- در صورت مراجعه هر فرد مشکوک بدون بیماری زمینه ای و پرخطر که دارای علائم خفیف «تب ، سرفه ، گلو درد ، لرز و استخوان درد» می باشند جهت قرنطینه در محل کار به امور اداری و HSE شرکت مربوطه معرفی گردد ، برای شاغلینی که محل سکونت در مجاورت محل کار می باشد قرنطینه در منزل با رعایت دستورالعمل « قرنطینه در منزل (pro-14-cov-0) » صورت پذیرد .
- نظارت مستقیم بر تب سنجی و شناسایی موارد سندرم شبه آنفلوانزا در صورت وجود موارد مشکوک اقدام به تکمیل فرم AO و ارسال به EOC و پیگیری اقدامات کنترلی
- هر فرد مشکوک دارای علائم خفیف و یا سندرم شبه آنفلوانزا ILI و SARI «تب ، سرفه ، گلو درد ، لرز و تنگی نفس» همراه با بیماری زمینه ای و پرخطر به سطح بالاتر اعزام گردد (دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی کووید ۱۹ وزارت بهداشت)
- وضعیت سلامت فرد شاغل مشکوک به کووید -۱۹ و اعضای خانواده وی روزانه تا ۱۴ روز پرسش و پیگیری گردد . در صورت تشدید علائم سریعاً به سطح بالاتر اعزام گردند (دستورالعمل اورژانس پیش بیمارستانی کووید ۱۹ وزارت بهداشت)
- در صورتیکه نیاز به حضور شاغل دارای علائم در محل کار الزامی باشد ، ضمن رعایت اصول حفاظت فردی (ماسک و ...) تردد صرفاً با خودرو اختصاصی صورت پذیرد و گندزدایی روزانه خودرو مربوطه صورت پذیرد .
- آموزش روش گندزدایی سطوح و خوردوها طبق دستورالعمل ابلاغی به کارکنان خدمات
- در صورت شناسایی فرد مشکوک ، لازم است نظارت بر گندزدایی محل کار فرد و کنترل وضعیت سلامت همکاران مجاور نامبرده تا ۱۴ روز به صورت تلفنی پیگیری گردد .
- لیست افراد قرنطینه شده مطابق دستورالعمل « قرنطینه در محل کار » به EOC و رئیس سلامت کار منطقه گزارش گردد .
- بازگشت به کار شاغلین قرنطینه شده و اعزامی منوط به کسب گواهی سلامت از پزشک معتمد/سلامت کار می باشد.